

Les vaches laitières doivent pouvoir exprimer les chaleurs

15.02.2021

La mauvaise fécondité, qui touche bien des vaches laitières, a de nombreuses causes. L'une d'elles est que, suivant la conception des stabulations, les vaches ne peuvent pas exprimer leurs symptômes et comportements quand elles sont en chaleur. Il devient nécessaire de corriger ça et de bien observer ses bêtes.

(26.02.2020) Les problèmes de fécondité sont la première cause de mise au rancart des vaches laitières. Ils correspondent à des chaleurs qui ne s'expriment pas, des chaleurs visibles mais des bêtes qui ne peuvent pas être fécondées ou des chaleurs qui réapparaissent deux mois après l'insémination. Malgré le marché fleurissant de poudres de perlimpinpin et autres remèdes miracles pour venir à bout de ces problèmes de fécondité, aucun ne semble en venir à bout. En effet, comme le déroulement des chaleurs est influencé par un grand nombre de facteurs, il est souvent impossible de déceler une seule cause responsable des troubles de fécondité. Une étude, qui date déjà un peu puisqu'elle avait été effectuée en 1994 par le professeur de médecine vétérinaire Lotthammer, avait décelé les causes suivantes des troubles de fécondité:

40 % dus à une observation déficiente des vaches

30 % dus à l'alimentation

15 % dus à la génétique

10 % dus à une hygiène déficiente

5 % dus à la conception des stabulations et aux conditions d'élevage

On peut remettre cette étude en question de manière critique, surtout en ce qui concerne l'influence des conditions d'élevage et de la conception des stabulations sur la fécondité. Ces derniers facteurs devraient certainement s'avérer plus importants puisque les stabulations entravées peuvent, par exemple, empêcher d'identifier à temps les symptômes des chaleurs et que les sols glissants des stabulations libres peuvent empêcher les vaches de vivre leurs comportements naturels quand elles sont en chaleur. Les étables sombres et le manque de lumière solaire, dans et autour des étables pendant les longs mois d'hiver peuvent aussi avoir des influences négatives sur la fécondité. Nous devons donc (re)donner à nos vaches laitières la possibilité de montrer leurs symptômes de chaleurs, et nous devrions prendre le temps d'observation nécessaire pour reconnaître les signaux émis par nos animaux. *Christophe Notz*

Informations supplémentaires:

Vaches laitières: santé (/production-animale/bovins/vaches-laitieres/sante-vaches-laitieres.html)
(Rubrique Élevages)



(/fileadmin/_processed_/9/c/csm_stier-flehmd-ta-1200_d4387399f9.jpg)

Le taureau restera toujours le meilleur gestionnaire de la fécondité des vaches (Photo: FiBL, Thomas Alföldi) (/fileadmin/images/bioaktuell/tierhaltung/Rindvieh/milchvieh/stier-flehmd-ta-1200.jpg)

Interlocuteur



FiBL

Christophe Notz

Santé et affouragement du bétail laitier

FiBL

Ackerstrasse 113

5070 Frick

Tél. 062 865 72 85

Courriel (<mailto:christophe.notz@fibl.org>)

www.fibl.org (<http://www.fibl.org/>)

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.